

Ropne zapalenie skóry nosa z czyrącznością

(zapalenie mieszków włosowych i czyrączność skóry nosa)

Patogeneza i obraz kliniczny

Ropne zapalenie skóry nosa jest zakażeniem bakteryjnym dotyczącym okolicy twarzy, które może być wynikiem urazu lub pogryzień przez stawonogi. Choroba ta ma prawdopodobnie ścisły związek z eozynofilową czyrącznością skóry twarzy u psów, ze względu na bardzo zbliżony przebieg oraz obraz kliniczny. Ropne zapalenie skóry nosa u psów i kotów nie zdarza się często.

Schorzenie klinicznie manifestuje się obecnością krost, grudek, rumienia, strupów, obrzęku, nadżerek lub też owrzodzeń i przetok. Zmiany lokalizują się na grzbiecie nosa i mogą być bolesne.

Różnicowanie

W diagnostyce różnicowej należy brać pod uwagę eozynofilową czyrączność skóry twarzy (pies), nużycę, grzybicę, choroby autoimmunologiczne, zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenie skóry wywołane promieniowaniem słonecznym i nadwrażliwość na ukąszenie komarów (kot).



RYCINA 3-69 Ropne zapalenie skóry nosa. Rumień, wysypka grudkowa oraz wyłysienie na grzbiecie nosa. W przeciwieństwie do chorób autoimmunologicznych, w przebiegu których zmiany lokalizują się w obrębie lusterka nosa, w przebiegu ropnego zapalenia skóry nosa objawy dermatologiczne dotyczą skóry owłosionej.

Rozpoznanie

1. Wykluczenie innych chorób o podobnym przebiegu.
2. Cytologia (wysięk, preparat odciskowy): ropne zapalenie z obecnością ziarniaków lub pałeczek.
3. Badanie dermatopatologiczne: zapalenie okołomieszkowe i zapalenie mieszków włosowych, czyrączność, zapalenie podskórza. Bakterie mogą być trudne do znalezienia w preparacie.
4. Badanie hodowlane: pierwotnym patogenem zwykle jest gronkowiec, często występuje także mieszana flora bakteryjna.

Leczenie i rokowanie

1. Aby usunąć strupy, codziennie przez 7–10 dni oczyszcza się zmienioną skórę przymoczkami z ciepłej wody oraz szamponem zawierającym chlorheksydyne.
2. Antybiotykoterapię ogólną należy prowadzić przez min. 3–4 tygodnie oraz kontynuować przez kolejne 2 tygodnie po całkowitym ustąpieniu objawów (zob. ramka 3-2).
3. Rokowanie jest dobre, ale u niektórych psów może dojść do trwałego bliznowacenia.



RYCINA 3-70 Ropne zapalenie skóry nosa. Wyłysienie, rumień, obrzęk i grudki na grzbiecie nosa u psa. Zwraca uwagę podobieństwo do eozynofilowej czyrączności skóry twarzy psów. (Dzięki uprzejmości: D. Angarano).