

Tabela 2.4 Antybiotykoterapia ostrego bakteryjnego niezłytu żołądkowo-jelitowego u dorosłych

Schorzenie	Wskazania	Antybiotyk z wyboru	Inne leki	Korzyści
Czerwonka	Większość chorych	Cyprofloksacyna 500 mg 2 razy dziennie	Kwas nalidyksowy 1 g 4 razy dziennie Ampicylina 500 mg 4 razy dziennie Kotrimoksazol 960 mg 2 razy dziennie	Złagodzenie objawów Skrócenie czasu utrzymywania się dolegliwości Ograniczenie przenoszenia zakażenia
Cholera	Wszyscy chorzy	Cyprofloksacyna	Tetracyklina 250 mg 4 razy dziennie Azytromycyna Kwas nalidyksowy Kotrimoksazol	Złagodzenie objawów Skrócenie czasu utrzymywania się dolegliwości Ograniczenie przenoszenia zakażenia
Biegunka wodnista	Nasilone objawy Przedłużająca się biegunka Chorzy w wieku podeszłym Immunosupresja	Cyprofloksacyna	Azytromycyna 500 mg 1 raz dziennie Kotrimoksazol	Złagodzenie objawów Skrócenie czasu utrzymywania się dolegliwości Potencjalnie zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań
Biegunka podróżnych	Sporadycznie	Cyprofloksacyna	Kotrimoksazol	Złagodzenie objawów Skrócenie czasu utrzymywania się dolegliwości
Potwierdzone zakażenie <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> , <i>Campylobacter</i>	Brak zmniejszenia nasilenia dolegliwości (sporadycznie koncepcyjna)	Cyprofloksacyna Azytromycyna	Erytromycyna Kotrimoksazol	Potencjalnie skrócenie czasu utrzy- wania się dolegliwości
<i>Clostridium difficile</i>	Większość chorych (chyba że objawy ustąpią samo- istnie)	Metronidazol 400 mg 3 razy dziennie	Wankomycyna 125 mg 4 razy dziennie	Złagodzenie objawów Skrócenie czasu utrzymywania się dolegliwości