



Zewnątrzkoronowe preparacje zębów

RYCINA 1-4 ciąg dalszy.

nika mipośredni mi wykorzy stując do tego celu stopy metali, połą cze niastopów metali i cera mi klub samą cera mi łę (rozdziały 11, 12 i 14). Umieszcze niekorony na zębie fila łowym zawsze wyma ga znaczne go usunię cia twardych tkanek bez względu na stan zęba fila łowego. Z tego powodu w przypad - kach, kiedy zęby fila łowe są zdrowe i bez większych wypełnień, czasami stosu jesię alterna tywną techni łę w postaci adhe zyj - nych stałych protez częściowych (lub **mostu Maryland**). Most Maryland nie wyma gakoron na zębach fila łowych. „Ramio -

na” odchodzą ceod przęsla mocuje się adhe zyj nieo szkliwa zębów fila łowych cemen tem na bazie żywi cy (rozdział 7). Retencja mostów Maryland jest gorsza niż tradycyjnych mo - stów i nie zawsze można je stosować ze względu na nieprawi - dlową okluzję lub poło że niezębów fila łowych.

Coraz powszechniej w uzupełnianiu brakujących zębów stosuje się implanty śródkostne. Zmniejszyły one zapo - trzebowanie na mosty i ruchome protezy częściowe.