

Najważniejsze informacje

Leki przeciwko nadciśnieniu

DZIAŁANIE

Leki przeciwko nadciśnieniu działają na układy naczyniowy, wieńcowy, moczowo-nerkowy i współczulny. Obniżają ciśnienie krwi, rzut serca oraz naczyniowy opór obwodowy.

ZASTOSOWANIE

- Do opanowywania nadciśnienia łagodnego do ostrego.
- Przeciwno dusznicy.
- W stanach nagłych spowodowanych nadciśnieniem.

PRZECIWWSKAZANIA

- Nadwrażliwość na lek.
- Zwężenie tętnic.
- Niewydolność naczyń mózgowych.
- Silna bradykardia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Niekontrolowana zastoinowa niewydolność serca, tyreotoksykoza.
- Beta-blokery mogą maskować objawy hipoglikemii u pacjentów chorych na cukrzycę.
- Zaburzenia czynności wątroby i nerek.

OBJAWY UBOCZNE

- Hipotensja, sedacja, zaburzenia sprawności seksualnej.
- Blokery kanałów wapniowych – bradykardia, obrzęk obwodowy, zaparcia.
- Beta-blokery – bradykardia, obniżenie przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zmniejszona kurczliwość serca, **zwężenie oskrzeli**.

UWAGI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI PACJENTA

1. **Należy monitorować parametry życiowe pacjenta.**
2. **Trzeba ostrzec pacjenta przed możliwością wystąpienia hipotensji ortostatycznej po zażyciu pierwszej dawki leku (np. pacjent powinien wstawać powoli) i zalecić zmiany stylu życia – ograniczenie masy ciała, zmniejszenie podaży sodu w diecie, codzienne ćwiczenia fizyczne.**
3. **Powinno się monitorować równowagę elektrolitowo-wodną oraz wyniki prób wątrobowych i nerkowych.**
4. **Należy unikać gwałtownego odstawienia leku, gdyż może to spowodować rykoszetywny nadmierny wzrost ciśnienia krwi.**
5. **Metyldopa to lek z wyboru u cierpiących na nadciśnienie pacjentek w ciąży.**

Ważne elementy pielęgnacji

Następstwa groźne dla zdrowia lub życia

Najczęściej spotykane efekty uboczne

Informacje istotne dla pacjenta