

**Najważniejsze informacje****Nitrogliceryna****DZIAŁANIE**

Azotan o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne (tętnice i żyły) o silniejszym oddziaływaniu na żyły, co powoduje obniżenie obciążenia wstępnego. Działanie rozszerzające tętniczki obniża układowy opór naczyniowy, co zmniejsza również obciążenie następcze.

**ZASTOSOWANIE**

- Przerwywanie napadów choroby wieńcowej i łagodzenie objawów bólowych choroby niedokrwiennej serca.
- Wraz z beta-blokerami lub blokerami kanałów wapniowych w celu przeciwdziałania tachykardii.

**PRZECIWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- Nadwrażliwość, silna niedokrwistość.
- Nie stosuje się wraz z lekami przeciwko zaburzeniom erekcji (np. Viagra).
- Poważne choroby wątroby lub nerek oraz stosowanie innych leków rozszerzających naczynia.
- Nie stosuje się wraz z beta-blokerami, werapamillem i diltiazemem.

**OBJAWY UBOCZNE**

Hipotensja ortostatyczna, ból głowy, tachykardia, suchość w ustach, nieostre widzenie.

**UWAGI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI PACJENTA**

1. Pacjenci cierpiący na chorobę niedokrwinną serca powinni zawsze nosić ze sobą leki na bazie azotanów (np. nitroglicerynę).
2. Pacjent powinien znać właściwe zasady przechowywania leku, gdyż nitrogliceryna ulega szybkiemu rozkładowi pod wpływem światła i ciepła. Niezużyte leki należy oddać do utylizacji po upływie 24 miesięcy od daty produkcji.
3. Jeżeli ból zamostkowy nie ustępuje w ciągu 5 minut od zażycia leku, pacjent powinien zadzwonić na numer alarmowy 112. Oczekując na przybycie pomocy, pacjent może zażyć jedną tabletkę co 5 minut (łącznie nie więcej niż 3 tabletki).
4. Podczas terapii azotanami należy unikać spożywania napojów alkoholowych.
5. Pacjent powinien unikać połykania i rozgryzania tabletek o przedłużonym uwalnianiu, by umożliwić substancji czynnej dotarcie do właściwej części układu pokarmowego. Lek podawany do zączyłka zębodołowo-policzkowego należy umieścić między policzkiem i dziąsłem.
6. Położenie plastrów z lekiem należy zmieniać. Plastry z lekiem usuwa się po 12–14 godzinach i nie zakłada nowych przez kolejne 12–14 godzin.
7. Przed podaniem leku pacjentowi hospitalizowanemu należy zmierzyć ciśnienie krwi.

Ważne elementy pielęgnacji

Następstwa groźne dla zdrowia lub życia

Najczęściej spotykane efekty uboczne

Informacje istotne dla pacjenta