

Ramka 3.1 Wywiad zdrowotny

- **Problemy anestetyczne**
- **Znaczenie** Nieudana intubacja w przeszłości będzie wymagać obecności konsultanta anestezjologa w przypadku potrzeby wykonania cięcia cesarskiego
- **Astma lub choroby w obrębie klatki piersiowej**
- **Znaczenie** Wymaga dokładnej oceny przed zastosowaniem analgezji wziewnej lub zabiegu operacyjnego
- **Choroby kręgosłupa**
- **Znaczenie** Mogą wymagać oceny przed zastosowaniem znieczulenia zewnątrzoponowego
- **Przetoczenie krwi**
- **Znaczenie** Mogą wytworzyć się przeciwciała w odpowiedzi na poprzednie przetoczenia
- **Cukrzyca**
- **Znaczenie** Wymagać będzie skoordynowanej opieki przedporodowej w obrębie zespołu internistycznego i położniczego. Cukrzyca wiąże się z chorobami noworodków (Seidel i wsp.1997)
- **Padaczka**
- **Znaczenie** Ryzyko teratogenności związane z terapią przeciwdrgawkową (Crawford 2002). Ryzyko utonięcia podczas drgawek (CEMD 2001)
- **Problemy z płodnością**
- **Znaczenie** Mogą być wymagane częstsze wizyty w gabinecie przedporodowym w celu reoceny stanu z potwierdzeniem prawidłowego przebiegu ciąży oraz uzyskania wsparcia
- **Zakażenia pochwy**
- **Znaczenie** Zakażenie wstępujące może powodować przedwczesny poród i/lub być przyczyną chorób noworodka
- **Choroby serca**
- **Znaczenie** Mogą wymagać specjalistycznej opieki przedporodowej i opieki podczas porodu. Zwiększenie pojemności naczyniowej podczas ciąży może zagrażać układowi sercowo-płucnemu
- **Wysokie ciśnienie krwi**
- **Znaczenie** Większe prawdopodobieństwo rozwoju stanu przedzucawkowego, dlatego wymaga dodatkowego monitorowania podczas ciąży
- **Choroby nerek lub układu moczowego**
- **Znaczenie** Wpływ progesteronu podczas ciąży prowadzi do poszerzenia moczowodów, zastoju w układzie moczowym i stąd zwiększonej skłonności do zakażenia układu moczowego [*urinary tract infection – UTI*] (Chamberlain & Morgan 2002). Zakażenie układu moczowego wiąże się ze zwiększonym ryzykiem przedwczesnego porodu
- **Choroba wątroby lub zapalenie wątroby**
- **Znaczenie** Cholestaza może ulec pogorszeniu podczas ciąży u kobiet z pierwotną marskością żółciową wątroby
- **Problemy dotyczące zdrowia psychicznego**
- **Znaczenie** Wywiad depresji związany jest ze zwiększonym ryzykiem depresji poporodowej. Samobójstwa znacznie częściej występują wśród matek (CEMD 2001; Lewis 2004)
- **Zabiegi operacyjne**
- **Znaczenie** Na przykład zabiegi operacyjne w obrębie szyi mogą wpływać