



Rycina 11-14. Trzy sposoby zamykania ran równoległych. **A.** Poziomy szew materacowy stosuje się do jednoczesnego zamknięcia wszystkich ran. **B.** Do zamykania tych ran można także wykorzystać taśmy. **C.** Jeżeli pasek skóry między ranami jest wystarczająco szeroki, można je zamknąć, stosując szwy naprzemienne. Zastosowanie ostatniej techniki wymaga zwrócenia uwagi na zachowanie dopływu krwi do tkanek w tej okolicy anatomicznej. (Zaadaptowano za zgodą: Zukin D, Simon R: *Emergency wound care: principles and practice*, Rockville, Md, 1987, Aspen Publishers.)

Do właściwego zbliżenia brzegów rany nie wystarczy założenie zwykłych powierzchownych szwów pojedynczych węzełkowych. Cienki brzeg należy unieść tak, aby dopasować do siebie odpowiednie warstwy tkanek.

Zamykanie ran o nierównej grubości brzegów

Zamykanie rany o nierównej grubości brzegów wymaga zastosowania szwu poziomego półzagiębnego, jak pokazano na rycinie 11-15. Brzeg cieńszy (z utratą skóry właściwej) zbliża się do brzegu grubszego (z zachowaną skórą właściwą), a następnie łączy się odpowiednie warstwy za pomocą szwów.