

Indeks leków stosowanych w nagłych zagrożeniach zdrowotnych^{1A}

Nazwa między-narodowa	Wskazania	Dawka
Adenozyna	PSVT z wąskimi zespołami QRS oraz dysrytmie związane z drogą dodatkową (np. zespół Wolffa-Parkinsona-White'a)	dorośli: dawka początkowa 6 mg w szybkim wstrzyknięciu i. v. w ciągu 1–3 s, po wstrzyknięciu przepłukać wkłucie 20 ml soli fizjologicznej, unieść kończynę; <i>powtórzyć dawkę</i> ; jeżeli po 1–2 min brak efektu, można jeszcze raz podać 12 mg w razie potrzeby, powtarzać co 1–2 min (maksymalna dawka jednorazowa 12 mg); dzieci: 0,1 mg/kg, w razie braku efektu podać 0,2 mg/kg (maksymalna pierwsza dawka 6 mg) w szybkim wstrzyknięciu i. v., potem przepłukać 5 ml soli fizjologicznej
Aktywowany węgiel drzewny	zatrucia doustne, przedawkowanie leków	około 1–2 g/kg masy ciała (więcej przy obecności treści pokarmowej), podawać w zawieszynie przez zgłębnik NG lub UG dorośli: 30–100 g; dzieci (1–12 lat): 15–30 g; niemowlęta (< 1 rok): 1 g/kg