

## Uwagi dotyczące bólu w klatce piersiowej

**Zobacz także****Zapis w diagramie**

Jest to prezentacja diagramowa. Ból w klatce piersiowej jest częstym tematem prezentacji w oddziale ratunkowym, gdzie przypadki tego typu stanowią 2–5 % wszystkich pacjentów. Przyczyna bólu może być różna, wywołana zawałem serca lub zapaleniem mięśnia, dlatego tak ważne jest prawidłowe zakwalifikowanie pacjenta do odpowiedniej grupy. W takim przypadku należy uwzględnić szeroki katalog kryteriów, nie wykluczać zagrożenia życia i stopnia bólu. Należy mieć na uwadze specyficzne kryteria, takie jak ból serca i opłucnej oraz zaburzenia rytmu.

**Specyficzne****kryteria różnicujące****Opis**

Ból serca	Klasycznie przejawia się bólem w środku klatki piersiowej. Może promieniować do lewej ręki lub szyi. Towarzyszyć mogą poty i nudności.
Nagła duszność	Duszność, która wystąpiła nagle lub jest nagłym pogorszeniem przewlekłej niewydolności oddechowej.
Zaburzenia rytmu serca	Bradykardia (<60 min u dorosłego), tachykardia (>100 min u dorosłego) lub niemiarywość tętna. U dzieci granice bradykardii i tachykardii zmieniają się z wiekiem.
Saturacja bardzo niska (SaO <sub>2</sub> )	<95% przy oddychaniu tlenem lub <90% przy oddychaniu powietrzem.
Ból opłucnowy	Ostry ból zlokalizowany w klatce piersiowej, nasilający się przy wdechu, kaszlu, kichaniu.
Wymioty uporczywe	Wymioty ciągle lub występujące z krótkimi przerwami.
Wywiad znamieny kardiologicznie	Stwierdzana nawracająca niemiarywość serca jest bezpośrednim zagrożeniem życia, może prowadzić bowiem do gwałtownego pogorszenia stanu.
Niska saturacja SaO <sub>2</sub>	SaO <sub>2</sub> <95% przy oddychaniu powietrzem.