

TABELA 18.2 Typowe neuroleptyki oraz atypowe leki przeciwpsychotyczne stosowane u dzieci (cd.)

Lek	Wskazania FDA u dzieci	Wskazania „poza ulotką FDA”	Częste objawy niepożądane: zaburzenia ruchu	Poważne neurologiczne objawy niepożądane
Metoklopramid	Choroby przewodu pokarmowego	Brak	Dystonia, senność Drżenie	Złośliwy zespół neuroleptyczny
Pimozyd	Zespół Tourette’a	Przewlekła schizofrenia	Aketyzja Zawroty głowy Dystonia Parkinsonizm Senność Późne zaburzenia ruchu	Nieefektywna termoregulacja Uderzenia ciepła lub hipotermia (rzadko) Złośliwy zespół neuroleptyczny (rzadko) Napady drgawkowe
Prochlorperazyna	Ciężkie nudności i wymioty	Brak	Aketyzja Zawroty głowy Dystonia Parkinsonizm Senność Późne zaburzenia ruchu	Nieefektywna termoregulacja Uderzenia ciepła lub hipotermia (rzadko) Złośliwy zespół neuroleptyczny (rzadko) Napady drgawkowe
Atypowe leki przeciwpsychotyczne				
Aripiprazol	Schizofrenia	Brak	Aketyzja Bóle głowy Bezsenna senność	Złośliwy zespół neuroleptyczny (rzadko) Napady drgawkowe (rzadko)
Olanzapina	Brak	Ciężkie zaburzenia depresyjne Zespół Tourette’a	Upośledzenie funkcji poznawczych	Dyskinezy; napady drgawkowe
Quetiapina	Brak	Delirium Zespół Tourette’a	Zawroty głowy (6%), Senność	Złośliwy zespół neuroleptyczny (rzadko) Napady drgawkowe (rzadko) Późne dyskinezy (rzadko)
Risperidon	Zaburzenia dwubiegunowe, schizofrenia Drażliwość w autyzmie	Zespół behawioralny, opóźnienie umysłowe Zaburzenia dwubiegunowe Zespół Tourette’a Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, odporne na leczenie; jękanie się Późne dyskinezy	Aketyzja Parkinsonizm Senność	Złośliwy zespół neuroleptyczny Napady drgawkowe Późne dyskinezy
Ziprasidon	Brak	Zaburzenia schizofreniczne	Aketyzja Zawroty głowy Senność	Złośliwy zespół neuroleptyczny (rzadko) Napady drgawkowe Późne dyskinezy