



Scenariusz 6.1

Kwasica ketonowa

RTG klatki piersiowej



EKG



Morfologia krwi

Leukocyty	14,2	8 000–12 000/mm ³
Hemoglobina	14,1	11–15 g/dl
Hematokryt	42	30–43%
PLT	430	150 000–450 000/mm ³

Badanie biochemiczne krwi

Glukoza	674	65–100 mg/dl
BUN	44	5–20 mg/dl
Sód	128	136-145 meq/l
Potas	3,8	3,5-5,5 meq/l
Chlorki	98	100-106 meq/l
CO ₂	10	22-32 meq/l
Kreatynina	3,6	0,2–1,4 mg/dl

Gazometria krwi tętniczej

pH	7,05	7,35-7,45
pO ₂	105	60-70 mmHg
pCO ₂	19	35-45 mmHg
HCO ₃ ⁻	10	22-26 mmol/L
Saturacja (%)	99%	96-100%

Badanie moczu

Przejrzystość	klarowny	
Kolor	słomkowy	
Glukoza	>1000	ujemny (mg/dl)
Bilirubina	ujemny	ujemny
Ciała ketonowe	wysokie stężenie	ujemny (mg/dl)
Ciężar właściwy	1020	1003-1,040
Krew	ujemny	ujemny
pH	5,0	5,0-8,0
Białka	ujemny	ujemny mg/dl
Urobilinogen	0,1	0,2 EU/dl
Azotyny	dodatni	ujemny
Leukocyty	dodatni	ujemny

Badanie mikroskopowe osadu moczu

Erytrocyty	pojedyncze	brak/HPF
Leukocyty	>50/HPF	brak/HPF
Nabłonki	1–5/HPF	brak/HPF
Bakterie	dużo	/HPF
Wąłeczki	Brak	brak/LPF

HPF- w polu widzenia przy dużym powiększeniu